

Skala do oceny stopnia zaawansowania odleżyn według Torrance'a

Imię i nazwisko pacjenta

PESEL

Adres zamieszkania

Opis

Stopień odleżyny

Blednące zaczerwienienie – odwracalne (lekki ucisk palcem powoduje zblednięcie obszaru zaczerwienienia – mikrokrążenie jest jeszcze nieuszkodzone).

I

Nieblednące zaczerwienienie – rumień utrzymuje się po zniesieniu ucisku. Spowodowane jest uszkodzeniem mikrokrążenia, zapaleniem i obrzękiem tkanek; towarzyszące objawy: powierzchowny obrzęk, uszkodzony naskórek, pęcherze, ból.

II

Uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką podskórną. Brzeg rany dobrze odgraniczony, otoczony obrzękiem i rumieniem; dno wypełnione czerwoną ziarniną lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.

III

Uszkodzenie dochodzi do powięzi, obejmuje tkankę podskórną. Brzeg rany jest zwykle odgraniczony, dno może być pokryte czarną lub brązową martwicą.

IV

Zaawansowana martwica obejmuje powięzi i mięśnie; dochodzi do stawów, kości, tkanki mięśniowej. W ranie znajdują się rozpadające masy tkanek i czarna martwica. Powstają jamy mogące komunikować się między sobą.

V

Data, pieczęć i podpis pielęgniarki
